

Leguminose e spinaci per l'industria

Pisello



VARIETÀ	TIPO PIANTA	UNITÀ CALORE	CALIBRI SURGELATO IN % - mm			CALIBRO MEDIO	RESISTENZE	
			< 8,75	8,75 - 10,2	> 10,2		HR	IR
SALINERO	N	630	34	63	3	3,8	BYMV/Fop:1	Pv
SPRING	N	640	27	63	10	4,2	Fop:1	-
PIZARRO	A	650	33	64	3	3,7	Fop:1	Pv
SHERWOOD	N	650	42	58		3,7	BYMV/Fop:1	Pv
SV0956QH	N	660	60	40		3,4	BYMV/Fop:1	Pv
TALBOT	N	670	29	66	5	3,9	Fop:1	BLRV
SV0955QH	N	705	37	53	10	3,8	BYMV/Fop:1,2	Pv
MILOR	N	785	25	63	12	4,3	Fop:1	-
SV0969QH	N	760	66	31	3	3,2	BYMV/Ep/Fop:1,2	Pv
AZARRO	N	800	35	63	2	3,7	BYMV/Fop:1	Pv
SV1033QF	N	800	30	67	3	3,8	BYMV/Ep/Fop:1,2	Pv
STAMPEDE	A	805	36	59	5	3,8	Fop:1	-
ASHTON	N	815	37	63		3,7	BYMV/Ep/Fop:1	Pv
QUANTUM	N	820	26	63	11	4,2	Fop:1	BLRV
TRISTAR	N	820	34	61	5	3,9	Fop:1	-
RESAL	N	860	36	60	4	3,8	Ep/Fop:1	-
SV1022QG	N	850	29	66	5	3,9	BYMV/PEMV/Ep/Fop:1,2	Pv
MAURICE	A	880	68	32		3,0	PEMV/Aps/Ep/Fop:1	Pv
PROMETHEUS	N	900	37	63		3,7	BYMV/PEMV/Ep/Fop:1	Pv

Fagiolino



VARIETÀ	MATURITÀ	CICLO	CARATTERISTICHE DEL BACCELLO					Lunghezza	RESISTENZE	
			> 7 mm	7 - 8 mm	8 - 9 mm	9 - 10,5 mm	< 10,5 mm		HR	IR
BARTAVA	- 2	precoce			40	60		12 - 13	BCMV/Cl:55	-
VALENTINO	0	precoce		0	35	65		13 - 14	BCMV	Ua:38,90
COMO	1	precoce			60	40		10 - 11	BCMV/Cl:55	-
LIVORNO	2	precoce		85	15			11	BCMV/Cl:55/Psp:2	-
SV1286GW	2	medio precoce		70	30			10,5 - 11,5	BCMV/Cl:55/Psp:2	-
SYBARIS	2	medio precoce		30	40	30		12,5 - 13,5	BCMV	Ua:90
TIMGAD	2	precoce		10	55	35		10 - 11	BCMV/Cl:55/Psp:2	-
SV1541GA	4	medio		70	30			11 - 13	BCMV/Cl:55	Ua:90
CADILLAC	4	medio		30	60	10		10 - 11	BCMV/Cl:55/Psp:2	-
CARTAGENA	4	medio		60	30			11 - 12	BCMV/Cl:55/Psp:2	-
GIOLLI	4	medio	0	70	30			11 - 13	BCMV/Cl:55	-
MAESTRALE	8	medio tardivo		80	20			14 - 15	BCMV/Cl:55	-

Fagiolo borlotto



VARIETÀ	CICLO	BACCELLO				SEME		RESISTENZE	
		Pianta	Colore	Lunghezza	N° grani	Forma	Colore	HR	IR
ETNA*	74 - 78 gg dalla settimana	di media vigoria	rosso su fondo crema	14 - 16 cm	07-giu	rotonda	screziature rosse su fondo chiaro	BCMV	-

* borlotto nano, seme con screziature rosse su fondo chiaro.

Spinacio



VARIETÀ	CICLO	SALITA A SEME	CRESCITA VEGETATIVA	COLORE FOGLIAME	RESISTENZE	
					HR	IR
TIPOLOGIA EUROPEA FOGLIA LISCIA						
SV3523VC	precoce	3	8	v.m.s.	Pfs:1-11,13,15,16	-
SOLOMON	precoce	4	7	v.m.s.	Pfs:1-9,11-16	Cv/Sb
FALCON	precoce	4	7	v.m.s.	Pfs: 1-7,9,11,13,15,16	-
SV1714VC	precoce / medio precoce	5	6	v.s.	Pfs:1-13,15	-
LANZAROTE	medio precoce	6	5	v.s.	Pfs:1-13,15	-
SV6161VC	medio precoce	6	5	v.s.	in test	-
MOLOKAI	medio precoce	6	5	v.s.	Pfs:1-13,15	-
USEPPA	medio	7	4	v.m.s.	Pfs:1-12,14-16	-
CALADONIA	tardivo	9	2	v.m.s.	Pfs:1-14,16	-
SV1371VC	tardivo	8	2	v.s.	in test	-
TIPOLOGIA INTERMEDIA (EUROPEA-ORIENTALE)						
NIGHTHAWK	precoce	4	7	v.s.	Pfs:1-7,9,11,13,15,16	-
TIPOLOGIA ORIENTALE						
SV3749VA	molto precoce	2	9	v.s.	Pfs:1-11,13,15,16	-
COMOROS	molto precoce	3	8	v.s.	CMV/Pfs:1-7,9,11,13,15,16	-
TAHITI	precoce	3	7	v.s.	Pfs:1-7,9,11,13,15	-
ZANZIBAR	medio	4	5	v.s.	Pfs:1-7,9,11,13,15,16	-
RS 06683549	medio	4	5	v.s.i.	Pfs:1-11,13,15,16	-

salita a seme 1= rapida 9= lenta
 crescita vegetativa 1= lenta 9= rapida
 colore foglie v.s.i : verde scuro intenso v.s. : verde scuro v.m.s. : verde medio scuro

Abbreviazioni

Agente Patogeno

Razze

Livello di resistenza

Cl	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	Lambda (Europe = race 55) Kappa (Europe = 31), Race 6	HR
Ua	<i>Uromyces appendiculatus</i>	Race 38, 90	HR/IR
BCMV	Bean common mosaic virus	-	HR
Aps	<i>Ascochyta pisi</i>	Race C	HR
Pv	<i>Peronospora viciae</i>	-	IR
Ep	<i>Erysiphe pisi</i>	-	HR
Fop	<i>Fusarium oxysporum f. sp. pisi</i>	Races: 1, 2, 5, 6	HR
BYMV	Bean yellow mosaic virus	-	HR
PEMV	Bean enation mosaic virus	-	HR/IR
BLRV	Bean leaf roll virus	-	IR
Pfs	<i>Peronospora farinosa f. sp. spinaciae</i>	Pfs:1-14	HR
CMV	Cucumber mosaic virus	-	HR
Sb	<i>Stemphylium botryosum</i>	-	IR
Cv	<i>Cladosporium variable</i>	-	IR

IR = Resistenza intermedia
 HR = Resistenza elevata

www.seminis.it

Tutte le informazioni sulle varietà e sulle loro rese fornite in modo verbale o per iscritto da parte di Monsanto o dei propri dipendenti o agenti devono considerarsi in buona fede, ma non costituiscono in nessun caso garanzia di Monsanto sulle performance e sull'idoneità delle varietà vendute. Le performance di una varietà possono essere influenzate da condizioni climatiche locali e da altri fattori esterni. Monsanto non si assume responsabilità per le informazioni date.

© Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. Tutti i diritti riservati. 09/2016

Seminis

Monsanto Agricoltura S.p.A.
 Vegetable Seeds Division
 Uffici Commerciali:
 Via Paradigna, 21/A - 43122 Parma
 Tel. 0521 398411 - Fax 0521 607352